

## Tabel 4

### Diergebonden forfaitaire gehalten 2017

#### Waarvoor gebruiken?

De diergebonden forfaitaire gehalten gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie van graasdieren en de stikstofcorrectie voor staldieren.

#### Mestproductie per dier in m<sup>3</sup>

De normen voor de mestproductie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m<sup>3</sup> gebruikt u voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit van dierlijke mest voor de betreffende periode. U gaat bij de berekening van de benodigde opslagcapaciteit uit van het aantal dieren dat u mag houden (op basis van uw milieuvergunning). De normen gebruikt u voor graasdieren en staldieren. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b.

#### Mestproductie per graasdier in kilo's stikstof en fosfaat

De gehalten voor de mestproductie per dier in kilo's stikstof en fosfaat gebruikt u voor de berekening van de mestproductie van het gemiddeld aantal graasdieren dat u op uw bedrijf heeft. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b. Voor de berekening van de totale mestproductie van graasdieren vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft met de bijbehorende forfaitaire excretienorm. Dit doet u voor alle graasdiercategorieën. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

#### Mestproductie per staldier in kilo's stikstof

De mestproductie voor staldieren berekent u met de stalbalans. De stikstofgehalten die voor staldieren zijn vermeld, gebruikt u alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieverplichtingen die geldt bij onder andere een stikstofproductie die kleiner is dan 350 kilo.

#### Stikstofcorrectie per staldier in kilo's stikstof

De gehalten voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) gebruikt u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie als onderdeel van de stalbalans.

#### Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

#### Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal en houdt u graasdieren? Dan gebruikt u niet de stikstofexcretiegehalten uit deze tabel. U moet dan gebruikmaken van de excretiegehalten voor stikstof uit de bijlage van de Regeling dierlijke producten. Voor de berekening van de fosfaatexcretie gebruikt u wel de gehalten uit deze tabel.

**Tabel 4** Diergebonden forfaitaire gehalten 2017

Diersoort en -categorie <sup>1</sup>	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug. tot 1 maart		Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar <sup>5</sup>
				m <sup>3</sup> <sup>2</sup>	kg stikstof <sup>3</sup>	kg fosfaat <sup>4</sup>		
<b>Rund</b>								
<b>10</b>								
<b>Melk- en kalfkoeien</b> (alle koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	100	G		Zie tabel 6	Zie tabel 6	Zie tabel 6		-
<b>Jongveejongerdan 1 jaar</b> voordemelkvee- houderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.	101	G	Drijfmest Vaste mest	4,4 2,2	32,3 29,1	9,6 9,6		-
<b>Jongvee van 1 jaar en ouder</b> (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren)	102	G	Drijfmest Vaste mest	9,5 4,7	66,9 61,3	21,9 21,9		-
<b>Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden</b> (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	112	S	Alle	1,6	(11,3)	-		3,0
<b>Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden</b> (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	117	G	Alle	2,6	21,5	7,6		-
<b>Startkalveren voor rosevlees of roodvlees</b> (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als rosevleeskalf of roodvleesstier worden gehouden)	115	G	Alle	1,2	10,5	3,4		-
<b>Rosevleeskalveren van ca. 3 tot ca. 8 maanden</b> (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	116	G	Alle	3,3	26,3	9,4		-
<b>Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht</b> (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest)	122	G	Drijfmest Vaste mest	4,2 2,2	28,2 25,6	9,7 9,7		-
<b>Weide- en zoogkoeien</b> (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	120	G	Drijfmest Vaste mest	11,2 5,3	75,4 75,3	26,9 26,9		-
<b>Fokstieren</b> (stieren van 1 jaar en ouder)	104	G	Alle	7,6	72,2	25,9		-
<b>Schaap</b>								
<b>55</b>								
<b>Schapen voor de vlees- en melkproductie</b> (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot ca. 4 maanden, voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn en rammen)	550	G	Alle	0,5	9,9	3,3		-
<b>Vleeschapen</b> tot ca. 4 maanden, gehouden op bedrijven waar ze niet zijn geboren	551	G	Alle	0,15	0,9	0,3		-
<b>Opfokkoeien</b> , weideschapen en vleeschapen van ca. 4 maanden en ouder	552	G	Alle	- <sup>6</sup>	7,2	2,2		-

Diersoort en -categorie <sup>1</sup>	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug. tot 1 maart		Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar <sup>5</sup>
				m <sup>3</sup> <sup>2</sup>	kg stikstof <sup>3</sup>	kg fosfaat <sup>4</sup>		
<b>Geit</b> <span style="float: right;"><b>60</b></span>								
<b>Melkgeiten</b> (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken)	600	G	Alle	0,76	10,2	4,7 <sup>7</sup>		-
<b>Opfokgeiten en vleesgeiten</b> tot ca. 4 maanden	601	G	Alle	0,06	0,9	0,4		-
<b>Opfokgeiten en vleesgeiten</b> van ca. 4 maanden en ouder	602	G	Alle	0,43	7,4	3,1		-
<b>Paard</b> <span style="float: right;"><b>94</b></span>								
<b>Pony's</b> (dieren met een schofthoogte tot 1,56 meter en inclusief veulens tot 6 maanden)	941	G	Alle	4,4	29,3	11,7		-
<b>Paarden</b> (dieren met een schofthoogte vanaf 1,56 meter en inclusief veulens tot 6 maanden)	943	G	Alle	7,8	53,7	22,4		-
<b>Ezel</b> <span style="float: right;"><b>96</b></span>								
<b>Alle ezels</b> (inclusief veulens tot 6 maanden)		G	Alle	3,6	19,3	8,4		-
<b>Middeneuropees edelhert</b> <span style="float: right;"><b>97</b></span>								
<b>Hinden</b> gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 6 maanden en bijbehorende bokken	971	G	Alle	0,94	18,6	6,7		-
<b>Herten</b> van 6 tot 12 maanden die worden gehouden om te worden geslacht	973	G	Alle	0,44	8,6	2,8		-
<b>Herten</b> van 12 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	974	G	Alle	1,09	21,4	6,4		-
<b>Damhert</b> <span style="float: right;"><b>98</b></span>								
<b>Hinden</b> gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken	981	G	Alle	1,31	11,8	3,4		-
<b>Alle herten</b> van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	982	G	Alle	0,81	9,7	2,4		-
<b>Waterbuffel</b> <span style="float: right;"><b>99</b></span>								
<b>Waterbuffelkoeien</b> (alle waterbuffelkoeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook waterbuffelkoeien die droog gezet zijn of worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	991	G	Alle	11,5	76,5	29,9		-
<b>Waterbuffeljongvee</b> (alle jongvee van waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar)	992	G	Alle	4,3	28,7	10,1		-

Diersoort en -categorie <sup>1</sup>	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug. tot 1 maart		Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar <sup>5</sup>
				m <sup>3</sup> <sup>2</sup>	kg stikstof <sup>3</sup>	kg fosfaat <sup>4</sup>		
<b>Varken</b>	<b>40</b>							
<b>Fokzeugen</b> waarvan de gespeende biggen op een ander bedrijf worden gehouden (ten minste eenmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de gespeende biggen aan een ander bedrijf worden geleverd).	400	S	Vaste mest, emissie-arm	1,03	(19,6)	-	2,1	
			Vaste mest, overig	1,03	(17,9)	-	3,8	
			Drijfmest, emissie-arm	1,4	(19,7)	-	2,0	
			Drijfmest, overig	1,4	(17,2)	-	4,5	
<b>Fokzeugen</b> inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg.	401	S	Vaste mest, emissie-arm	2,0	(27,4)	-	2,9	
			Vaste mest, overig	2,0	(25,0)	-	5,3	
			Drijfmest, emissie-arm	2,5	(27,5)	-	2,8	
			Drijfmest, overig	2,5	(24,1)	-	6,2	
<b>Opfokzeugen en -beren van ca 25 kg tot geslachtsrijpheid</b>	404	S	Vaste mest, emissie-arm	0,81	(13,9)	-	1,6	
			Vaste mest, overig	0,81	(12,6)	-	3,0	
			Drijfmest, emissie-arm	0,91	(13,3)	-	2,3	
			Drijfmest, overig	0,91	(11,1)	-	4,5	
<b>Dekberen en zoekberen, geslachtsrijp</b>	406	S	Vaste mest, emissie-arm	1,3	(20,1)	-	3,5	
			Vaste mest, overig	1,3	(19,1)	-	4,5	
			Drijfmest, emissie-arm	1,8	(19,7)	-	3,9	
			Drijfmest, overig	1,8	(18,4)	-	5,2	
<b>Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier op eigen bedrijf</b>	407	S	Vaste mest, emissie-arm	0,25	(3,5)	-	0,4	
			Vaste mest, overig	0,25	(3,2)	-	0,7	
			Drijfmest, emissie-arm	0,3	(3,5)	-	0,4	
			Drijfmest, overig	0,3	(3,1)	-	0,8	
<b>Vleesvarkens</b>	411	S	Vaste mest, emissie-arm	0,71	(11,1)	-	1,3	
			Vaste mest, overig	0,71	(10,1)	-	2,3	
			Drijfmest, emissie-arm	0,75	(10,6)	-	1,8	
			Drijfmest, overig	0,75	(8,9)	-	3,5	

Diersoort en -categorie <sup>1</sup>	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug. tot 1 maart		Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar <sup>5</sup>
				m <sup>3</sup> <sup>2</sup>	kg stikstof <sup>3</sup>	kg fosfaat <sup>4</sup>		
<b>Kip</b> <span style="float: right;"><b>30</b></span>								
<b>Leghennen en (groot)ouderdieren</b> jonger dan 18 weken	300	S	Drijfmest	0,012	(0,25)	-	0,10	
			Dieppitstal	0,004	(0,10)	-	0,24	
			Alle mestbanden	0,007	(0,27)	-	0,09	
			Volièrestal	0,009	(0,23)	-	0,12	
			Overig	0,007	(0,16)	-	0,18	
<b>Leghennen en (groot)ouderdieren</b> 18 weken en ouder	301	S	Drijfmest	0,025	(0,54)	-	0,23	
			Dieppitstal	0,006	(0,19)	-	0,58	
			Alle mestbanden	0,014	(0,58)	-	0,19	
			Volièrestal	0,018	(0,42)	-	0,34	
			Overig	0,015	(0,37)	-	0,40	
<b>(Groot)ouderdieren van vleeskuikens</b> jonger dan 20 weken	310	S	Alle	0,004	(0,10)	-	0,26	
<b>(Groot)ouderdieren van vleeskuikens</b> 20 weken en ouder	311	S	Emissie-arm	0,018	(0,68)	-	0,44	
			Overig	0,018	(0,45)	-	0,67	
<b>Vleeskuikens</b> (kippen die worden gehouden voor de slacht)	312	S	Emissie-arm	0,011	(0,45)	-	0,05	
			Overig	0,011	(0,35)	-	0,15	
<b>Kalkoen</b> <span style="float: right;"><b>20</b></span>								
<b>Jonge kalkoenen</b> (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 0 weken tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)	200	S	Alle	0,011	(0,24)	-	0,21	
<b>Opfokkalkoenen</b> (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 weken tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)	201	S	Alle	0,071	(1,60)	-	0,85	
<b>Kalkoenen ouderdieren</b> (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder)	202	S	Alle	0,073	(1,62)	-	0,85	
<b>Vleeskalkoenen</b> (kalkoenen die worden gehouden voor de slacht)	210	S	Alle	0,048	(0,99)	-	0,78	
<b>Nerts</b> <span style="float: right;"><b>75</b></span>								
<b>Fokteven</b> (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie)		S	Alle	0,039	(2,0)	-	0,2	
<b>Konijn</b> <span style="float: right;"><b>90</b></span>								
<b>Voedsters</b> (alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende zogende jongen, opfokkonijnen en fokrammen)	900	S	Alle	0,126	(1,13)	-	1,58	
<b>Vleeskonijnen</b> (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie)	901	S	Alle	0,025	(0,30)	-	0,42	

Diersoort en -categorie <sup>1</sup>	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug. tot 1 maart		Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar <sup>5</sup>
				m <sup>3</sup> <sup>2</sup>	kg stikstof <sup>3</sup>	kg fosfaat <sup>4</sup>		
<b>Overige diersoorten</b>								
<sup>8</sup> Rattus norvegicus ( <b>Bruine rat</b> ), Mus musculus ( <b>Tamme muis</b> ), Cavia porcellus ( <b>Cavia</b> ), Mesocricetus auratus ( <b>Goudhamster</b> ), Meriones unguiculatus ( <b>Gerbil</b> ) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	15	S	Alle	0,054	(0,65)	-	0,65	
<b>Vleeseenden</b> (eenden die worden gehouden voor de slacht)	801	S	Vaste mest	0,028	(0,38)	-	0,38	
			Drijfmest	0,081	(0,60)	-	0,17	
<b>Ouderdieren van vleeseenden</b> in opfok (opfokperiode tot 20 weken)	802	S	Vaste mest	0,037	(0,44)	-	0,49	
			Drijfmest	0,110	(0,72)	-	0,22	
<b>Ouderdieren van vleeseenden</b> (legperiode vanaf 20 weken)	803	S	Vaste mest	0,045	(0,53)	-	0,58	
			Drijfmest	0,130	(0,85)	-	0,26	
<sup>8</sup> Struthio camelus ( <b>Struisvogel</b> ), Dromaius novaehollandiae ( <b>Emoe</b> ) en Rhea Americana ( <b>Nandoe</b> ) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	25	S	Alle	0,56	(12,3)	-	12,3	
<sup>8</sup> Anser cygnoides ( <b>Knobbelgans</b> ) en Anser anser ( <b>Grauwe gans</b> ) (alle geslachtsrijpe vrouwelijke ganzen)	28	S	Alle	0,086	(3,2)	-	3,2	
<sup>8</sup> Phasianus colchicus ( <b>Fazant</b> ), Perdix perdix ( <b>Patrijs</b> ) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	35	S	Alle	0,006	(0,12)	-	0,12	
<sup>8</sup> Columbia livia ( <b>Vleesduif</b> ), Numida meleagris ( <b>Helmpareldhoen</b> ), (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren en voor vleesduiven ook de vleeskuikens)	37	S	Emissie-arm	0,009	(0,46)	-	0,036	
			Overig	0,009	(0,42)	-	0,078	

G = graasdier

S = staldier

- Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie, dan hanteert u de forfaits van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.
- Normen voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit dierlijke mest.
- Gehalten voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren gebruikt u deze gehalten (cursief) alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieve verplichtingen.
- Gehalten voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren niet van toepassing.
- Gehalten voor de berekening van de totale stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) als onderdeel van de stalbalans. Voor graasdieren niet van toepassing. Voor graasdieren is de stikstofcorrectie al meegenomen in de forfaitaire stikstofexcretie (kg stikstof per dier per jaar).
- De mestproductie van deze dieren (voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit) is al verrekend in het forfait van de fokschappen.
- Ingeval van melkgeiten gehouden op door SKAL als biologisch gecertificeerde bedrijven is het getal 4,1 in plaats van 4.7.
- De gehalten zijn inclusief jongen en mannelijke dieren. Voor de berekening van de mestproductie telt u alleen de geslachtsrijpe vrouwelijke dieren.